Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I



#### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 3

#### MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 3 marzo 1983.

Approvazione di monografie di preparazioni galeniche per uso umano.

#### SOMMARIO

#### MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 1983. — Approvazione di monografie di preparazioni galeniche	<b>3</b> 5
per uso umano	Pag. 5
Pomate:	
Bacitracina 500 U.I./g e polimixina B solfato 30.000 U.I./g - unguento	Pag. 7
Idrocortisone acetato 1% p/p = crema	» 9
Idrocortisone acetato 1% p/p - unguento	» 10
Idrocortisone acetato 1% p/p e neomicina solfato 0,5% p/p = crema	» 11
Idrocortisone acetato 1% p/p e neomicina solfato 0,5% p/p = unguento	» 13
Prometazina 2% p/p - crema	» 14
Sciroppi - Elisiri	
Codeina fosfato 0,15% e sodio benzoato 1% p/v = sciroppo	Pag. 15
	» 16
Efedrina cloridrato 0,1% p/v = sciroppo	» 18
Fenobarbitale sodico 0,55% p/v = elisir	» 19
Soluzionia	
Salala 30/ p/y e mentala 10/ p/y saluzione alcoolica e callutaria	Pag. 20

#### LEGGI E DECRETI

#### MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 1983.

Approvazione di monografie di preparazioni galeniche per uso umano.

#### IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio successivo, con cui sono state emanate disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano ed è stato, fra l'altro, stabilito, in apposito allegato, l'elenco-indice dei preparati galenici costituenti il « formulario nazionale »;

Visto, in particolare, l'art. 2 dello stesso decreto, che prevede l'approvazione, con successivi provvedimenti, delle monografie delle preparazioni galeniche comprese nell'elenco-indice del « formulario nazionale » e nei suoi aggiornamenti, e precisa che le preparazioni devono corrispondere ai caratteri ed ai saggi descritti nelle monografie a partire dal termine indicato nei decreti di approvazione di queste ultime;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982, con il quale, fra l'altro, sono state apportate variazioni e rettifiche al predetto elenco-indice del « formulario nazionale »;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 313 del 13 novembre 1982, con cui sono state approvate centrotredici monografie di preparati galenici per uso umano;

Considerato che, nella sessione del 14 gennaio 1982, la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale ha espresso parere favorevole alla pubblicazione di altre undici monografie di preparazioni galeniche, predisposte dalla stessa commissione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di queste ulteriori monografie e dettare disposizioni sull'adeguamento dei prodotti alle prescrizioni contenute nelle medesime;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 197 del 20 luglio 1981, le monografie di preparati galenici officinali per uso umano allegate al presente decreto.

I preparati cui si riferiscono le monografie indicate nel comma precedente devono corrispondere ai caratteri e ai saggi descritti nelle stesse e alle prescrizioni del presente decreto a partire dal 1º settembre 1983.

I lotti regolarmente prodotti in data anteriore al termine previsto dal secondo comma del presente articolo possono essere mantenuti in commercio fino al 31 agosto 1984.

#### Art. 2.

Le « avvertenze » contenute nelle monografie di cui all'articolo precedente, le diciture riportate sotto le voci « etichette » e « uso », nonchè quelle relative a temperatura, esposizione alla luce e modalità di chiusura, riportate sotto la voce « conservazione », devono essere incluse nell'etichetta o riprodotte sull'involucro e/o sul contenitore, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera h), del richiamato decreto ministeriale 26 giugno 1981.

La posologia indicata nelle monografie deve essere riportata in etichetta o sull'involucro e/o contenitore, in sostituzione di quella comunicata da ciascun produttore al Ministero della sanità, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1983

# BACITRACINA E POLIMIXINA

# Unguento di bacitracina 500 U.L/g e polimixina B solfato 30.000 U.L/g

# Categoria terapeutica Antibatterico

## Composizione. 100 g contengono

50 000 UI	3 000 000 U.I	d þ
•	•	•
	•	•
	•	•
:	•	
•		•
•		•
		:
	•	•
		•
•	•	•
•	٠	•
•		
•		•
_	ato	
•	olf	
•	ω.	
	1	
Bacitracina	Polimizina B solfato	Eccipienti

#### CARATTERI

Unguento di consistenza pastosa, filante, omogeneo

### IDENTIFICAZIONE

### Cromatografia su stato sottile

Soluzione da esaminare (a). A 1 g circa si aggiungono 50 ml di etere si agita e si estrae la miscela con 10 ml di soluzione tampone pH 6 (fosfati), suddivisi m 2 o 3 porzioni. Gli estratti riuniti si portano a volume con soluzione tampone pH 6 (fosfati) in pallone tarato da 10 ml.

Soluzione di confronto (b) Una quantità di bacitracina di riferimento, corrispondente a 500 U.I., si scioglie in 10 ml di soluzione tambone pH 6 (fosfati)

Soluzione di confronto (c) Una quantità di polimizina B solfato di riferimento, corrispondente a 30 000 U.I si scioglie in 10 ml di soluzione tampone pH 6 (fosfati)

Procedimento. Su una lastra ricoperta di uno strato di gel di silice G si depositano separatamente, 10 µl di ciascuna soluzione (a), (b) e (c) Si effettua la cromatografia usando come fase mobile una miscela formata da 25 ml di n-propanolo e acqua (3:1), 5 ml di benzene, 1 5 ml di glicole (etilenico) e 1,0 ml di acido acetico glaciale, preparata al momento dell'uso, per un percorso di 15 cm circa. Si asciuga la lastra all'aria e si secca

### POMATE

in stufa a 100 – 105°C per 20 minuti Si spruzza la lastra con una soluzione di ninidrina (5 g/l) in acelone e si scalda a 120°C per 5 minuti. Il cromatogramma ottenuto con la soluzione da esaminare (a) presenta due macchie principali: una di color marrone e l'altra di color viola con Rf e dimensioni uguali a quelle del cromatogramma ottenuto con le soluzioni di confronto (b) e (c).

14661

Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia "Pomate"

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

A 1 g circa esattamente pesato si aggiungono 50 ml di etere si agita e la miscela si estrae con 3 porzioni da 3 ml ciascuna di soluzione tampone pH 6 (losfati). Gli estratti, riuniti, si portano a volume, in palloncino tarato da 10 ml con soluzione tampone pH 6 (losfati).

Bacitracina

10 ml dell'estratto diluito in modo opportuno si titola con metodo microbiologico come descritto nella monografia « Bacitracina »

Polimixina B solfato

10 ml dell'estratto diluito in modo opportuno si titola con metodo microbiologico, come descritto nella monografia «Polimixina B solfato» Titolo. Deve corrispondere ad una attività della bacitracina e ad una attività della polimixina B solfato compresa tra il 90,0 per cento e il 115,0 per cento delle attività corrispondenti alle quantità prescritte rispettivamente per la bacitracina e per la polimixina B solfato.

CONSERVAZIONE

In tubo di alluminio o di plastica o in recipiente di vetro o altro materiale idoneo ben chiuso, al riparo dal calore.

Etichette Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Scadenza 2 anni dalla data di preparazione

Posologia Secondo prescrizione medica

Uso Applicazioni locali

AVVERTENZA

# IDROCORTISONE ACETATO

### Crema - 1 per cento

# Categoria terapeutica Antinfiammatorio

# Composizione. 100 g contengono

g 1,0	ď þ
•	
•	
•	•
•	•
tato	•
rtisons ace	enti
Idrocon	Eccipie

#### CARATTERI

Crema bianca, omogena, di consistenza pastosa

### IDENTIFICAZIONE

### Si operi al riparo dalla luce

A 2,5 g si aggiungono 10 ml di alcool e si scalda a b.m. fino a fusione della massa Si mescola e si raffredda in frigorifero fino a completa risolidificazione della massa. La soluzione alcoolica si filtra in palloncino tarato da 10 ml e si porta a volume con alcool.

A) Cromatografia su strato sottile. Sulla soluzione si procede come descritto al capitolo « Cromatografia su strato sottile degli steroidi ormonali », procedimento A, utilizzando idrocortisone acetato di riferimento come confronto. Il cromatogramma ottenuto con la soluzione da esaminare (a) presenta una macchia con Rf. colore e fluorescenza uguali a quella del cromatogramma ottenuto con la soluzione di riferimento.

B) Ad I ml della soluzione precedente, si aggiungono I ml di acqua e 2 ml di acido solforico; si sviluppa una colorazione gialla con fluorescenza verde particolarmente intensa a luce U.V di 365 nm; la fluorescenza permane anche dopo aver aggiunto la soluzione solforica a 15 ml di acqua.

#### 4*GGI*

Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia « Pomate »

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

### Si operi al riparo dalla luce

zolio cloruro soluzione. Si elimina l'aria dal palloncino mediante corrente di azoto esente si scalda a b m fino a fusione della massa. Si mescola e si raffredda in frigorifero fino a risolidificazione della massa fusa. La soluzione alcoolica si filtra in pallone tarato da 100 esente da aldeidi. Si porta a volume con lo stesso solvente e si agita. Si prelevano lievemente e si lascia a riposo a b.m. a 30°C per 1 ora. Si raffredda rapidamente e si alcool esente da aldeidi, trattato nella stessa maniera. Contemporaneamente e nelle stesse A 3,5 g circa esattamente pesati si aggiungono 30 ml di alcool esente da aldeidi ml e si ripete l'operazione per altre 3 volte, con porzioni da 20 ml ciascuna di alcoo. 2,0 ml di questa soluzione e si diluiscono a 20,0 ml con alcool esente da aldeidi. In un palloncino tarato da 25 ml di introducono 10,0 ml di soluzione e 2 ml di difemilietrada ossigeno; si aggiungono immediatamente 2 ml di tetrametilammonio idrossido soluzione diluita e si elimina di nuovo l'aria mediante azoto esente da ossigeno. Si tappa, si agita porta a volume con alcool esente da aldeidi e si agita. Si misura l'assorbanza della soluzione al massimo di assorbimento a 485 nm circa, usando come bianco 10 ml di condizioni, si prepara una soluzione di confronto a partire da 10,0 ml di una soluzione di idrocortisone acetato di riferimento (0,035 g/l) in alcool esente da aldeidi. Si determina il contenuto di idrocortisone acetato (C<sub>23</sub>H<sub>32</sub>O<sub>6</sub>) nel campione in esame per confronto con l'assorbanza della soluzione di riferimento. **Titolo.** Deve corrispondere a non meno del 90,0 per cento ed a non più del 110,0 per cento della quantità prescritta di idrocortisone acetato  $(C_{23}H_{23}O_b)$ 

### CONSERVAZIONE

In tubo di alluminio o di plastica o in recipiente di vetro o altro materiale idoneo ben chiuso, al riparo della luce

Etichette Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Posologia Secondo prescrizione medica

Uso Applicazioni locali,

#### AVVERTENZA

# IDROCORTISONE ACETATO

### Unguento - 1 per cento

In tubo di alluminio o di plastica o in recipiente di vetro o altro materiale idoneo

ben chiuso, al riparo dalla luce.

CONSERVAZIONE

Antinfiammatorio
Antin
feranemica
ateonria.

Composizione 100 g contengono

Idrocortisone acetato

Eccipient

Uso. Applicazioni locali

1,0 q b

ро

AVVERTENZA

Uso esterno

CARATTERI

Unguento filante omogeneo, di consistenza pastosa

### IDENTIFICAZIONE

Si opera come descritto nella monografia « Idrocortisone acetato crema »

Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia «Pomate»

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Si opera come descritto nella monografia « Idrocortisone acetato crema »

Titolo Deve corrispondere a non meno del 900 per cento ed a non più del 110,0 per cento della quantità prescritta di idrocortisone acetato (C23H32O6).

Etichette Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica Posologia. Secondo prescrizione medica

# IDROCORTISONE E NEOMICINA

# Crema di idrocortisone acetato 1,0 per cento e neomicina solfato 0,5 per cento

Crema di idrocortisone e neomicina

Categoria terapeutica Antinfiammatorio - antibatterico

Composizione. 100 g contengono

		•
ad	þΩ	
_		
άţ	_	
ë	27	
ä	1,0	
drocortisone acetato	omicina solfato	
8	B	:::
12.5	12.	Ē
6	12.0	E
é	3	-:i
ĝ	Ş	Eccipienti
7	7	-

1.0

q b

#### CARATTERI

Crema bianca, omogenea, di consistenza pastosa

### IDENTIFICAZIONE

### Idrocortisone acetato

Si operi al riparo dalla luce

A 2,5 g si aggiungono 10 ml di alcool e si scalda a b m fino a fusione della massa Si mescola e si raffredda in frigorifero fino a completa risolidificazione della massa. La soluzione alcoolica si filtra in palloncino tarato da 10 ml e si porta a volume con alcool.

A) Cromatografia su strato sottile Sulla soluzione si procede come descritto al capitolo «Cromatografia su strato sottile degli steroidi ormonali », procedimento A utilizzando idrocoriisone acetato di riferimento come confronto. Il cromatogramma ottenuto con la soluzione da esaminare presenta una macchia con Rí, colore e fluorescenza uguali a quella del cromatogramma ottenuto con la soluzione di riferimento.

B) A 2 ml della soluzione precedente si aggiungono 2 ml di acido solforico; si sviluppa una colorazione gialla con fluorescenza verde particolarmente intensa a luce U.V di 365 nm; la fluorescenza permane anche dopo aver aggiunto la soluzione solforica a 10 ml di acqua.

### Neomicina solfato.

A 6 g si aggiungono 20 ml di etere si agita a lungo e la miscela si estrae con 10 ml di acqua suddivisi in 3 porzioni

- A) La soluzione ottenuta dà le reazioni caratteristiche dei solfati
- B) Cromatografia su strato sottile

Soluzione da esaminare (a) La soluzione è ottenuta come sopra riportato

Soluzione di confronto (b) 10 mg di neomicina solfato di riferimento si sciolgono in 10 ml di acqua.

Procedimento Su una lastra ricoperta di uno strato di gel di silice H si depositano separatamente 20 µl di ciascuna soluzione (a) e (b). Si effettua la cromatografia usando come fase mobile una soluzione di ammonto acetato (38,5 g/l) in acqua, preparata al momento dell'uso per un percorso di circa 15 cm. Si asciuga la lastra all'aria e si secca a 100 - 105°C per 1 ora. Si spruzza la lastra ancora calda con una soluzione di minidrina (1 g/l) in n-butanolo saturo di acqua e si scalda di nuovo a 100 - 105°C per 5 minuti circa. Il cromatogramma, ottenuto con la soluzione da esaminare (a) presenta una macchia con Rt, colore e dimensione uguali a quella del cromatogramma ottenuto con la soluzione di confronto (b).

#### SAGGI

Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia « Pomate »

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

### Idrocortisone acetato

Si operi al riparo dalla luce

A 3 5 g circa, esattamente pesati, si aggiungono 30 ml di alcool esente da aldeidi si scalda a b m. fino a fusione della massa. Si mescola e si raffredda in frigorifero fino

a riso idificazione del a massa fusa La soluzione alcoolica si filtra in pallone tarato da 100 ml e si ripete l'estrazione per altre 3 volte con porzioni da 20 ml ciascuna di alcool esente da aldeidi. Si porta a volume con lo stesso solvente e si agita. Si prelevano 2,0 ml di questa soluzione che si diluiscono a 20 0 ml con alcool esente da aldeidi contemporaneamente, si prepara una soluzione di confronto di idrocortisone acetato di riferimento contenente 350 µg di sostanza in 10 0 ml. In due palloncini tarati da 25 ml si introducono, rispettivamente, 10,0 ml di ciascuna soluzione, e 2 ml di tritenilletrazolio chorro soluzione. Si elimina l'aria dai palloncini mediante corrente di azolo esente da ossigeno; si aggiungono immediatamente 2 ml di tetrametilammonio idrossido soluzione diluita e si elimina di nuovo l'aria 30°C per 1 ora. Si raffredda rapidamente e si porta al volume di 25,0 ml con alcool esente da aldeidi. Si misurano le assorbanze delle due soluzioni a 485 nm circa, usando come bianco 10 ml di alcool esente da aldeidi, trattati alla stessa maniera. Si determina il contenuto di idrocortisone acetato (C<sub>2.</sub>H<sub>22</sub>O<sub>6</sub>) nel campione in esame per confronto con l'assorbanza della soluzione di riferimento.

#### Neomicina solfato

Ad I g circa esattamente pesato si aggiungono 20 ml di etere si agita e la miscela si estrae con 10 ml di soluzione tambone pH 8. La soluzione acquosa si filtra in pallone tarato da 50 ml e l'estrazione si ripete per altre 3 volte. Gli estratti, filtrati e riuniti si portano al volume di 50 ml con soluzione tambone pH 8. Si procede come descritto alla monografia « Neomicina solfato ».

**Titolo** Deve corrispondere a non meno del 90 0 per cento e a non più del 110 0 per cento dalla quantità prescritta di idrocortisone acetato  $(C_{23}H_{22}O_6)$  ed ad una attività della neomicina solfato compresa tra il 90.0 per cento ed il 115.0 per cento dell'attività corrispondente alla quantità prescritta di neomicina solfato.

### CONSERVAZIONE

In tubo di alluminio o di plastica o in recipiente di vetro o altro materiale idoneo ben chiuso, al riparo dal calore

Etichette Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Scadensa 2 anni dalla data di preparazione

Posologia Secondo prescrizione medica

Uso Applicazioni locali

AVVERTENZA

# IDROCORTISONE E NEOMICINA

# Unguento di idrocortisone acetato 1,0 per cento e neomicina solfato 0,5 per cento

Unguento di idrocortisone e neomicina

Categoria terapeutica Antinfiammatorio - antibatterico

Composizione. 100 g contengono

#### CARATTERI

Unguento di consistenza pastosa, filante, omogeneo

### IDENTIFICAZIONE

Si procede come descritto nella monografia « Idrocortisone e neomicina crema »

#### SAGGI

Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia « Pomate »

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Si procede come descritto nella monografia «Idrocortisone e neomicina crema»

**Titolo.** Deve corrispondere a non meno del 90,0 per cento ed a non più del 110,0 per cento della quantità prescritta di idrocortisone acetato ( $C_{23}H_{33}O_6$ ) e ad una attività della neomicina solfato compresa tra il 90,0 per cento ed il 115,0 per cento dell'attività corrispondente alla quantità prescritta di neomicina solfato.

### CONSERVAZIONE

In tubo di alluminio o di plastica o in recipiente di vetro o altro materiale idoneo ben chiuso al riparo dal calore

Etichette Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Scadenza 2 anni dalla data di preparazione

Posologia Secondo prescrizione medica

Uso Applicazioni locali

AVVERTENZA

### PROMETAZINA

### Crema - 2 per cento

Crema antiallergica

Categoria terapeutica Antistaminico

Composizione 100 g contengono

Prometazina

Eccipienti

q b ۵đ

2 0

CARATTERI

Crema bianca, omogenea

IDENTIFICAZIONE

Si operi al riparo dalla uce

per 2 volte con 40 ml di cloroformio. Gli estratti cloroformici, riuniti, si diluiscono a Una quantità di prodotto, corrispondente a circa 200 mg di prometazina, si estrae 100 ml con lo stesso solvente e si agita. Si procede come descritto al capitolo «Cromatografia su strato sottile delle fenotiazine»

SAGGI

Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia «Pomate»

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Si operi al riparo dalla luce

Una quantità di crema esattamente pesata e corrispondente a circa 50 mg di prometazina si agita in pallone tarato da 500 ml con circa 400 ml di acido cloridrico 0 1 N

a 100,0 ml con acqua Si misura immediatamente l'assorbanza della soluzione, al massimo di assorbimento a 249 nm circa. Il valore di A (1%, 1 cm) è di 910.

portando a volume con lo stesso solvente e si filtra, 50 ml della soluzione si portano

**Titolo** Deve corrispondere a non meno del 900 per cento ed a non più dei 1100 per cento della quantità prescritta di prometazina (C1,H20N2S)

CONSERVAZIONE

In tubo di alluminio o di plastica o in recipiente di vetro o altro materiale idoneo ben chiuso al riparo dalla luce

Etichette Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Scadenza 3 anni dalla data di preparazione

Posologia Secondo prescrizione medica

Uso Applicazioni locali

AVVERTENZA

### SODIO BENZOATO CODEINA FOSFATO 0,15 PER CENTO E 1 PER CENTO

#### Sciroppo

Sciroppo di codeina

### Categoria terapentica. Bechico

# Composizione. 100 ml contengono

150	-	
mg	¢۵	
•	•	
	•	
•		
•		
•	•	
•	•	
•	•	
	•	
•		
•	•	
	•	
•	•	ť
•		matizzat
•	•	ij
•	•	E
•	•	ç
•	•	a
•	•	Š
•	_	bbook
2		Ğ.
fosfato	ä	sciro
ő	nzc	2
20	be	3
lei.	110	veicolo
,õ	Ö	_
•	v,	•#

ELISIR

闰

SCIROPPI

#### CARATTERI

Liquido sciropposo limpido

### IDENTIFICAZIONE

A) 50 g di sciroppo si introducono in un imbuto separatore si aggiungono 10 ml di sodio idrossido soluzione diluita e si estrae con cloroformio; gli estratti cloroformici riuniti, si disidratano con sodio solfato anidro, si filtra, si evapora a b m. ed al residuo si aggiungono 0,5 ml di acido mitrico diluito: si ottiene una colorazione gialla. B) Una piccola porzione di sciroppo si diluisce con acqua e si aggiungono alcune gocce di ferro (-ico) doruro soluzione (3): si forma un precipitato rosa carnicino

#### SAGGI

pH. Deve essere compreso fra 6,0 e 7,5

Altri requisiti. Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia « Sciroppi »

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Codeina fosfato A 30 0 ml di sciroppo si aggiungono 30 ml di acqua 10 ml di sodio idrossido soluzione diluita e si estrae con 4 porzioni da 20 ml ciascuna di cloroformio Gli estratti cloroformici, riuniti, si filtrano attraverso cotone imbevuto di cloroformici lavando il cotone con altri 10 ml di cloroformio. Le soluzioni cloroformiche riunite previamente disidratate con sodio sollato amidio, si filtrano e si evaporano. Il residuo si riprende con 10 ml di acido acetico glaciale e si titola con acido perclorico 0,01 N in presenza di cristal violetto soluzione.

1 ml di acido perclorico 001 N corrisponde a 4244 mg di codeina fosfato (C<sub>18</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>3</sub> H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 15H<sub>2</sub>O).

**Sodio benzoato.** A 20 0 ml di sciroppo si aggiungono 20 ml di acqua e 25 ml di acido solforico diluito; si agita e si estrae con 3 porzioni da 20 ml ciascuna di elere, raccogliendo gli estratti eterei in imbuto separatore dove si lavano con 2 porzioni da 10 ml ciascuna, di acqua Gli estratti eterei, lavati, si disidratano con sodio solfato amidro, si filtra e si evapora a b.m Il residuo si riprende con 30 ml di alcool neutralizzato e si titola con sodio idrossido 0,1 N, usando fenolftaleina soluzione come indicatore

1 ml di sodio idrossido 0 1 N corrisponde a 14 41 mg di sodio benzoato (C,HsO,Na)

**Titolo** Deve corrispondere a non meno del 950 per cento e a non più del 1050 per cento delle quantità prescritte di codeina fosfato  $(C_{18}H_{21}NO_3 \ H_3PO_4 \ 1,5H_2O)$  e di sodio benzoato  $(C_7H_5O_2Na)$ 

### CONSERVAZIONE

In recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce

Etichette. Soggetto alla disciplina della legge n 685/1975 Tabella V Di vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Posologia 2-3 cucchiaini al giorno o secondo prescrizione medica

# DIFENIDRAMINA CLORIDRATO

### Sciroppo - 0,25 per cento

Sciroppo di difenidramina

Categoria terapeutica Antistaminico

Composizione 100 ml contengono

Difenidramina cloridrato in veicolo sciropposo aromatizzato

250

Пg

CARATTERI

Liquido sciropposo limpido

IDENTIFICAZIONE

A) Cromatografia su strato sottile

Soluzione da esaminare (a) Una quantità di sciroppo, opportunamente diluita con acqua, corrispondente a circa 50 mg di difenidramina cloridrato, si acidifica con acido cloridrico diluito e si agita con 3 porzioni; da 20 ml ciascuna di etere Si allontana l'etere e si estrace con 2 porzioni, da 20 ml ciascuna, di eloroformio. Gli estratti cloroformici, riunti, si seccano su sodio solfato anidro; si filtra, si evapora il cloroformio e il residuo si scioglie in 5 ml di cloroformio.

Soluzione di confronto (b). 0,1 g di difenidramina cloridrato di riferimento si sciolgono n cloroformo, portando al volume di 10 ml.

B) I ml della soluzione da esaminare (a) si evapora a secco. Il residuo si scioglie in alcune gocce di acqua e vi si aggiungono 2 ml di acido sollorico. Si forma un precipitato giallo che per aggiunta di 0,5 ml di acido nitrico diventa rosso-ciliegia. Si aggiungono 15 ml di acqua, e, dopo raffreddamento, 5 ml di clorolormio, quindi si agita. Nello strato cloroformico si sviluppa una intensa colorazione violetta.

C) 5 g circa di sciroppo, diluiti con 10 ml di aequa, danno le reazioni caratteristiche dei cloruri.

SAGGI

pH. Deve essere compreso fra 5,0 e 6,0.

Sostanze analoghe. Si effettua una cromatografia su strato sottile utilizzando una lastra ricoperta di uno strato di gel di silice H.

Soluzione del prodotto in esame (a). Si utilizza la soluzione da esaminare (a) preparata come descritto alla reazione di identificazione A.

Soluzione di confronto (b). 1 ml di soluzione del prodotto in esame (a) si diluisce a 100 ml con cloroformio.

Procedimento. Si depositano, separatamente sulla lastra, 5 µl di ciascuna soluzione (a) e (b). Si effettua la cromatografia con una fase mobile formata da una miscela di 8 v. di cloroformio e 2 v. di metanolo, per un percorso di circa 10 cm. Si asciuga la lastra all'aria e si spruzza con potassio iodobismutato soluzione diluita. Se sul cromatogramma, ottenuto con la soluzione in esame (a), compaiono altre macchie, oltre alla principale, nessuna di esse deve essere più intensa di quella ottenuta con la soluzione di confronto (b),

Altri requisiti. Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia «Sciroppi».

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Una quantità di sciroppo, opportunamente diluito con acqua, corrispondente a 0,1 g difenidramina cloridrato si acidifica con acido cloridrico diluito, si agita con 3 porzioni, da 20 ml ciascuna, di etere, si allontana l'etere, si alcalinizza con sodio idrossido 5 N e la soluzione si estrae con porzioni successive da 20 ml ciascuna di etere fino a estrazione completa. Gli estratti eterei, riuniti, si lavano con 2 successive porzioni da 5 ml

di acqua che, riunite, vengono estratte con 15 ml di etere. I lavaggi eterei e gli estratti eterei riuniti si evaporano a secco e il residuo si scioglie in 15,0 ml di acido solforico 0,1 N. L'eccesso di acido si titola con sodio idrossido 0,1 N usando rosso metile soluzione come indicatore.

l ml di acido solforico 0,1 N corrisponde a 29,18 mg di difenidramina cloridrato ( $C_{17}H_{21}NO\cdot HC$ ),

**Litolo.** Deve corrispondere a non meno del 95,0 per cento c a non più del 105,0 per cento della quantità prescritta di difenidramina cloridrato ( $C_{17}H_{21}NO$ . HCl).

CONSERVAZIONE

In recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce.

Etichette. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica,

Posologia. 1 - 2 cucchiaini al giorno o secondo prescrizione medica.

AVVERTENZA

Può dare sonnolenza.

# EFEDRINA CLORIDRATO

### Sciroppo - 0,1 per cento

ciroppo di efedrina

Categoria terapeutica Balsamico - broncodilatatore

Composizione 100 ml contengono

Etedrina cloridrato	Bm	mg 100
Sodio benzoato	ಡ	
Timo estratto liquido .	ρ¢	-
Liquirizia estratto molle	ρū	25
n veicolo sciropposo aromatizzato		

#### CARATTERI

Liquido sciropposo limpido di colore rosso bruno

### IDENTIFICAZIONE

A) 10 mi circa si alcalinizzano con 10 ml di sodio idrossido soluzione diluita e si estraggono con 4 porzioni da 5 ml ciascuna di cloroformio Gli estratti cloroformici riuniti si disidratano con sodio solfato amidro, si filtrano e si evaporano a secco a b.m. Al residuo si aggiungono 0 1 ml di rame (-ico) solfato soluzione e 2 ml di sodio idrossido soluzione diluita: il liquido assume colorazione violetta. Si aggiunge 1 ml di etere e si agita: lo strato etereo si colora in rosso-porpora e quello acquoso in azzurro.

B) 10 ml circa si acidificano con 5 ml di acido solforico dilutito e si estraggono con 4 porzioni da 5 ml ciascuna di elere. Gli estratti eterei riuniti si disidratano con sodvo solfato anultro, si filtrano e si evaporano a secco a b.m.; al residuo si aggiungono 5 ml di acqua e 0,1 g di calcio carbonato. Si fa bollire, si filtra ed al filtrato si aggiungono alcune gocce di ferro (-ico) cloruro soluzione (1): si forma un precipitato rosa carnicino.

C) 10 ml circa si evaporano a secco e si calcinano Il residuo dà alla fiamma una colorazione gialla

SAGGI

pH Deve essere compreso fra 60 e 75

Altri requisiti Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia «Sciroppi»

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

#### Efedrina cloridrato

A 200 ml si aggiungono 30 ml di acqua e 10 ml di sodio idrossido soluzione dilutia. Si satura con circa 10 g di sodio cloruro, si agita e si estrae con 4 porzion da 20 ml ciascuna di cloroformio, filtrando gli estratti cloroformici attraverso cotone imbevuto di cloroformio. Il filtro si lava con altri 10 m di cloroformio e gli estratti, riuniti, si titolano con acido perclorico 0 01 N, usando rosso metile in cloroformio come indicatore.

I ml di acido perclorico 0.01~N corrisponde a  $2.017~\mathrm{mg}$  di efedrina cloridrato  $(C_{10}\mathrm{H_{18}NO}~\mathrm{HCl})$ .

#### Sodio benzoato

A 200 ml si aggiungono 20 ml di acqua e 20 ml di acido solforico diluito Si estrae con 4 porzioni da 20 ml ciascuna di etere. Gli estratti eterei si disidratano con sodio solfato anidro si filtrano e si evaporano a secco a b.m. Il residuo si riprende con 50 ml di alcool neutralizzato e si titola con sodio idrossido 0,1 N, usando fenolitaleina soluzione come indicatore.

l ml di sodio idrossido  $\theta$  l N corrisponde a 1441 mg di sodio benzoato ( $C_7H_5O_2Na$ ).

**Titolo** Deve corrispondere a non meno del 95,0 per cento e a non più del 105 0 **per** cento delle quantità prescritte di efedrina cloridrato  $(C_{10}H_{15}NO\ HCl)$  e di sodio **ben**zoato  $(C_{7}H_{5}O_{5}Na)$ 

### CONSERVAZIONE

In recipiente ben chiuso al riparo dalla luce

Etichette Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Posologia 3 - 4 cucchiaini al giorno o secondo prescrizione medica

#### AVVERTENZA

Non superare la posologia indicata senza autorizzazione del medico

# FENOBARBITALE SODICO

### Elisir - 0,55 per cento

fenobarbitale
ij
Sciroppo

# Categoria terapeutica. Sedativo - ipnotico

# Composizione. 100 ml contengono

Fenobarbitale sodico	•	900	0,55
in majorio alicomonico			

#### Preparazione.

5,50	150	125	150	000
<b>p</b> 0	рVO	ρū	<b>p</b> 0	a ml
•	٠	•	•	4
•	•	•	•	6
•	•	•	•	٠
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	٠
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
_	•	•	•	•
.3	•	•	•	•
Ö	•	•	•	•
<i>a</i> 2	•	•	•	•
tal	•	_	•	•
Ģ		3.	•	•
Fenobarbitale sodico	Glicerolo	Saccarosio	Alcool	Acqua q.b a ml 1000
I	G	v)	4	4

Il fenobarbitale sodico si scioglie nella metà di acqua necessaria, si aggiungono il glucerolo e il saccarosio, si agita fino a completa soluzione e sempre mescolando si aggiunge l'alcool Si porta a volume con acqua e si filtra.

#### CARATTERI

Liquido limpido, incolore

### IDENTIFICAZIONE

10 ml circa si acidificano con 5 ml di acido cloridrico diluito e si estraggono con etere; l'estratto etereo si evapora a secco a b.m e il residuo si scioglie in alcuni ml di sodio idrossido N si aggiungono 4 ml di piridina e 1 ml di rame (-ico) solfato soluzione con piridina: si forma un precipitato rosa.

#### SAGGI

pH. Deve essere compreso fra 7,5 e 8,5

Altri requisiti Deve soddisfare alle norme prescritte nella monografia «Sciroppi»

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

50.0 ml si acidificano con 10 ml di acido cloridrico diluito e si estraggono con 4 porzioni da 20 ml ciascuna di elere Gli estratti eterei riuniti, si lavano con 10 ml di acqua e la fase acquosa si estrae con altri 20 ml di elere che si riuniscono ai precedenti estratti. I liquidi eterei riuniti si disidratano su sodie solfato anidro; si filtra e si evapora a b.m. Il residuo si secca per qualche minuto a 105°C si riprende con 50 ml di dimetilformamide e si titola con sodio metossido 0,1 N, usando azzurro timolo in dimetilformamide (10 g/l) come indicatore

l ml di sodio metossido 0,l N corrisponde a mg 25,40 di fenobarbitale sodico ( $C_{12}H_{11}N_2O_3Na$ ).

**Titolo.** Deve corrispondere a non meno del 950 per cento e a non più del 105,0 per cento della quantità prescritta di fenobarbitale sodico  $(C_{12}H_{11}N_2O_3Na)$ .

### CONSERVAZIONE

In recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce

Etichette. Soggetto alla disciplina della legge n. 685/1975 Tabella IV Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non repetibile

# Posologia. Secondo prescrizione medica

# SALOLO 3 PER CENTO E MENTOLO 1 PER CENTO

### Soluzione alcoolica

Soluzione alcoolica di salolo e mentolo (collutorio)

# Categoria terapeutica Antisettico

Composizione 100 ml contengono

Saiolo
Mentolo
in soluzione alcoolica

#### CARATTERI

Soluzione limpida, incolore, con odore caratteristico di menta

### IDENTIFICAZIONE

A) 3 ml circa si diluiscono con 3 ml di alcool e si aggiungono alcune gocce di ferro (-1co) cloruro soluzione (3): si sviluppa una colorazione violacea

B) Ad alcuni ml si aggiunge acqua di bromo si forma un precipitato bianco

C) 10 ml circa si evaporano a b m ed il residuo si scalda con alcuni ml di sodro idrossido soluzione diluita; si diluisce con acqua e si acidifica con acido cloridrico: si forma un precipitato bianco cristallino e si sviluppa odore di fenolo Il precipitato filtrato, lavato ed essiccato, fonde a 155-157°C.

#### SAGGI

Grado alcoolico Deve essere compreso fra 85º e 90º

# DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

#### Salolo.

Ad 1 g circa esattamente pesato si aggiungono 10 ml di soluzione di sodio idrossido (25 g/l) e si scalda per 5 minuti a bm, bollente. Si raffredda e si pone in beuta

## INOIZOTOS

con tappo a smeriglio lavando con acqua fino a 200 ml circa. Si aggiungono 50 ml di potassio bromato-bromuro-soluzione e 10 ml di acido cloridrico. Si tappa e si agita frequentemente per 30 minuti. Si aggiungono poi 15 ml di soluzione di potassio ioduro (100 g/l) e si agita per altri 15 minuti. Si titola con sodio tiosolfato 0,1 N usando salda d'amido come indicatore.

1 ml di sodio tiosol/ato 0,1 N corrisponde a 1,785 mg di salolo ( $C_{13}H_{10}O_3$ ).

#### Mentolo.

Con metodo gascromatografico. Fase stazionaria polietilenglicole 20 M al 10 per cento su supporto siliceo per cromatografia a temperatura programmata da 80°C a 160°C. Rivelatore a ionizzazione di fiamma. Si effettua la determinazione sull'estratto etereo della soluzione, in confronto con una soluzione eterea contenente mentolo avente la stessa concentrazione.

**Titolo.** Deve corrispondere a non meno del 95,0 per cento e a non più del 105,0 per cento delle quantità prescritte di salolo  $(C_{13}H_{10}O_3)$  e di mentolo  $(C_{10}H_{20}O)$ .

#### CONSERVAZIONE

In recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce.

Etichette. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Posologia. Secondo prescrizione medica.

Uso. Collutorio o gargarismo, previa diluizione con acqua.

#### AVVERTENZA

Uso esterno.

(1556)

ERNESTO LUPO, direttore
VINCENZO MARINELLI, vice direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore

(4651044/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.